

Литература

1. Артамонова В.Г., Мухин Н.А. Профессиональные болезни. М.: Медицина, 2004. 432 с.
2. Гигиена труда / под ред. Н.Ф. Измерова, В.Ф. Кириллова. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. 592 с.
3. Методическое пособие по курсу подготовки специалистов по безопасности дорожного движения на автомобильном транспорте / под общ. ред. И.А. Венгерова. М., 2000. 180 с.
4. Приказ МЗ СССР от 29.09.1989 № 555 «О совершенствовании системы медицинских осмотров трудящихся и водителей индивидуальных транспортных средств» (в редакции приказа МЗМП РФ № 280, Госкомсанэпиднадзора РФ от 05.10.1995 № 88, приказа МЗМП РФ от 14.03.1996 № 90).

Поступила в редакцию 31.03.2011.

ANALYSIS OF PERIODIC MEDICAL EXAMINATIONS OF PERSONS WORKING IN MOTOR TRANSPORT COMPANIES OF PRIMORSKY KRAI

M.A. Yakushina¹, N.A. Rushchenko², E.G. Monastyrskaya³

¹Medical and Diagnostic Center "Metchnikoff" (2a Captain Shefner St. Vladivostok 690001 Russia), ²Vladivostok State Medical University (2 Ostryakova Av. Vladivostok 690002 Russia), ³War Veterans Hospital (19 Novozhilova St. Vladivostok 690011 Russia)
Summary – The paper describes results of periodic medical examinations of persons working in the motor transport companies of Primorye in 2010. The newly diagnosed diseases were registered for 7% persons. The authors draw the conclusion that it is required to carry out sound medical examination if there is an assumption of professional nosology.
Key words: medical examination, drivers, professional diseases.

Pacific Medical Journal, 2011, No. 3, p. 94–95.

УДК 616.98:578НIV-06:616.523(571.63)

ТЕЧЕНИЕ ГЕРПЕСВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ У ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ В ПРИМОРСКОМ КРАЕ

А.В. Кузьмина¹, Л.Г. Зима¹, С.А. Сотниченко¹, А.Ф. Попов²

¹Краевой клинический центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями (690011 г. Владивосток, ул. Борисенко, 50), ²Владивостокский государственный медицинский университет (690950 г. Владивосток, пр-т Острякова, 2)

Ключевые слова: ВИЧ-инфекция, герпес.

Среди наиболее частых сопутствующих заболеваний при ВИЧ-инфекции одно из первых мест занимает простой герпес. Герпес – одна из наиболее распространенных и плохо контролируемых инфекций человека. Актуальность проблемы герпеса на фоне ВИЧ-инфекции объясняется тем, что оба вируса-возбудителя способны взаимодействовать на клеточном и молекулярном уровнях, итогом чего является прогрессирование ВИЧ-инфекции. Герпес-вирусы широко распространены в человеческой популяции, они способны поражать практически все органы и системы организма, вызывая латентную, острую и хроническую формы инфекции [1]. Для ВИЧ-инфицированных характерна атипичная клиническая картина герпетической инфекции и ее частые рецидивы [2].

Материал и методы. Проведен анализ 288 историй болезни ВИЧ-инфицированных больных, находившихся на стационарном лечении в СПИД-центре в 2009–2010 гг.

Результаты исследования и обсуждение полученных данных. Контингент госпитализированных был представлен жителями края (167 человек – 58%) и г. Владивостока (121 человек – 42%). В большинстве случаев (82,3%) это были неработающие лица, 76,3% из них внутривенно употребляли наркотики. В терминальной стадии ВИЧ-инфекции в 2009 г. находилось 13,5%, а в 2010 г. – 14,6% госпитализированных.

В 80 наблюдениях была выявлена активация простого герпеса с выраженной клинической картиной. Возраст этих больных колебался от 21 до 51 года (лица до 40 лет – 60%), преобладали мужчины и составили – 52 человека. Только у 15 пациентов (18,7%)

установлена 3-я стадия ВИЧ-инфекции, а у большинства диагностированы стадии вторичных заболеваний (4А–В, 5). 34 человека (42,5%) получали высокоактивную антиретровирусную терапию.

В большинстве случаев (86,2%) простой герпес протекал субклинически и был выявлен при иммуноферментном анализе. Клинические проявления зарегистрированы у 11 больных (13,8%): герпетические высыпания в локализованной форме в области губ – у 6, в области гениталий – у 1, на туловище – у 4, на нижних конечностях – у 1 и на волосистой части головы – у 3. Все пациенты с клиническими проявлениями простого герпеса получали противовирусную терапию: ацикловир, виферон и другие препараты.

Литература

1. Рахманова А.Г., Пригожина В.К., Неверов В.А. Инфекционные болезни: руководство для врачей общей практики. М.–СПб. ССЗ, 1995. 302 с.
2. Клинические рекомендации. ВИЧ-инфекция и СПИД / под ред. В.В.Покровского. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2006. 128с.

Поступила в редакцию 31.03.2011.

COURSE OF HERPES VIRUS INFECTION DIAGNOSED IN HIV-POSITIVE PATIENTS IN PRIMORSKY KRAI

A. V. Kuzmina¹, L. G. Zima¹, S. A. Sotnichenko¹, A. F. Popov²

¹Regional Clinical Centre for HIV-Infections Prevention and Relief (50 Borisenko St. Vladivostok 690011 Russia), ²Vladivostok State Medical University (2 Ostryakova Av. Vladivostok 690950 Russia)
Summary – The authors have analyzed 288 medical records of HIV-positive patients stayed in the HIV Centre for treatment in 2009–2010. In 80 cases, the doctors diagnosed active simple herpes. The greater part of patients (86.2%) herpetic infection was following in subclinical form, in the others cases it was found clinically. In 81.3% of cases, the herpetic infection was observed at the stage of secondary diseases of HIV infection.
Key words: HIV-infection, herpes.

Pacific Medical Journal, 2011, No. 3, p. 95.