

УДК 616.988:578.828.6]:313.13

О.И. Липовская¹, В.А. Иванис², В.Д. Новицкая¹, О.Б. Дадалова¹, Е.А. Мадич¹, А.С. Журавлева¹

¹ Краевая клиническая больница №2 (690065 Владивосток, ул. Русская, 55), ² Владивостокский государственный медицинский университет (690950 Владивосток, пр-т Острякова, 2)

АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ ПО МАТЕРИАЛАМ КРАЕВОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ № 2

Ключевые слова: ВИЧ-инфекция, диагностика.

В последние годы во Владивостоке наблюдается значительный рост частоты выявления ВИЧ-инфекции, что является отражением неблагоприятной ситуации как в Приморском крае, так и в целом по Российской Федерации [1, 2]. За 2006–2008 гг. в Краевую клиническую больницу № 2 госпитализирован 101 больной с ВИЧ-инфекцией (из них первичных, не состоявших на диспансерном учете, — 54). Отмечен прогрессивный рост числа ВИЧ-инфицированных пациентов среди госпитализированных: 2004 г. — 16, 2005 г. — 24, 2006 г. — 26, 2007 г. — 39, 2008 г. — 36. 52 больных выявлены в инфекционном отделении, 15 — в отделении челюстно-лицевой хирургии, 14 — в отделении переливания крови, 9 — в терапевтических отделениях, по 4 — в отделениях хирургии и гинекологии и 3 — в глазном отделении.

Все пациенты госпитализированы по экстренным показаниям, чаще с диагнозами: «ангина» или «аденовирусная инфекция», «лихорадка неясной этиологии», «менингит» и «герпес». Реже на догоспитальном этапе диагностировались переломы челюсти, флегмоны подчелюстной области, внематочная беременность и самопроизвольный аборт, пневмоторакс и перитонит. 70% госпитализированных обследованы на ВИЧ по клиническим показаниям (код 113), 30% — как лица, употребляющие инъекционные наркотики (код 102). Сроки установления диагноза составили от 4 до 8 дней. Среди ВИЧ-инфицированных 55% составляли мужчины, 45% — женщины.

Число госпитализированных в инфекционное отделение возрастало ежегодно: 2004 г. — 7, 2005 г. — 10, 2006 г. — 13, 2007 г. — 19, 2008 г. — 20. Преобладали люди трудоспособного возраста — до 40 лет (78,8%), чаще встречались неработающие (53%), лица без определенного места жительства (4%) и студенты (4%). У большинства больных определялась 2–3-я степень иммунодефицита. Среди госпитализированных по поводу острого сепсиса в каждом третьем случае выявлен милиарный туберкулез; 6 человек (11,5%) умерли от полиорганной недостаточности.

Среди доноров (разовая сдача в отделении переливания крови) за период наблюдения выявлено 14 случаев ВИЧ-инфекции (из них 13 первичных). Число инфицированных доноров в 2008 г. в сравнении с 2006 г. уменьшилось в 4 раза. Возросло число больных ВИЧ-инфекцией, госпитализированных в отделение

челюстно-лицевой хирургии (15 случаев), причем первично выявленные зарегистрированы только в 2007 г. Все пациенты нуждались в хирургической помощи по поводу переломов челюсти, флегмон и лимфаденитов подчелюстной области.

В хирургическое отделение по экстренным показаниям госпитализированы 4 больных, 2 из которых уже состояли на диспансерном учете. 4 ВИЧ-инфицированных выявлены в гинекологическом отделении (3 первичных). В глазном отделении диагностированы 3 случая ВИЧ-инфекции у пациентов с тяжелыми увеитами. В терапевтические отделения госпитализированы 9 ВИЧ-инфицированных, в том числе 6 больных с диагнозом «пневмония» (ВИЧ-инфекция выявлена впервые).

Таким образом, за 2006–2008 гг. среди госпитализированных в Краевую клиническую больницу № 2 увеличилось количество первично выявленных ВИЧ-инфицированных, особенно в инфекционном отделении (более 25% от всех наблюдений). Настораживало обнаружение ВИЧ-инфицированных среди потенциальных доноров. Кроме того, увеличилось число ВИЧ-инфицированных, которые поступали в хирургические отделения стационара. Причиной госпитализации в большинстве наблюдений было тяжелое течение вторичных заболеваний на фоне тяжелого иммунодефицита.

Литература

1. Покровский В.В. ВИЧ — СПИД в России: ситуация и прогноз // Эпидемиол. и инфекционные болезни. 2008. № 3. С. 4–7.
2. Тимошенко В.С., Полушин О.Г. Клинико-морфологические проявления энтеровирусной Коксаки-инфекции у взрослых // Тихоокеанский медицинский журнал. 2003. № 2. С. 61–63.

Поступила в редакцию 01.06.2009 г.

ANALYSIS OF HIV INFECTION INCIDENCE RATE BASED ON MATERIALS OF REGIONAL CLINICAL HOSPITAL No. 2

O.I. Lipovskaya, V.A. Ivanis, V.D. Novitskaya, O.B. Dadalova, E.A. Madich, A.S. Zhuravleva
Regional Clinical Hospital No. 2 (55 Russkaya St. Vladivostok 690065 Russia), Vladivostok State Medical University (2 Ostryakov Av. Vladivostok 690950 Russia)

Summary — The paper shows analysis of HIV-infection incidence rate diagnosed during admission to Regional Clinical Hospital #2 (Vladivostok) in 2006–2008 in the amount of 101 observations, among which 25% of primary HIV-infection incidents have been diagnosed in the infectious disease ward. It is noted that a number of patients having late stages of disease described by severe secondary diseases has increased.

Key words: HIV-infection, diagnostics.

Иванис Виктория Александровна — д-р мед. наук, профессор, заведующая кафедрой инфекционных болезней ВГМУ; тел.: 8 (4232) 32-49-46; email: ivanis2003@bk.ru.