УДК 615.322:582.812.4

DOI: 10.34215/1609-1175-2021-3-40-44

Изучение химического состава плодов дальневосточных видов растений семейства вересковых (Ericaceae)

А.А. Саликова, С.Г. Пономарчук, Н.В. Плаксен

Тихоокеанский государственный медицинский университет, Владивосток, Россия

Цель: анализ химического состава плодов дальневосточных видов растений семейства вересковых (Ericaceae). **Материал и методы.** Использованы свежие плоды и сок из плодов красники (*Vaccinium praestans*) и шикши черной (*Empetrum nigrum*). Качественный состав органических кислот в плодах и в соке исследовали методом высокоэффективной жидкостной хроматографии, количественное определение свободных органических кислот – методом алкалиметрии с помощью автоматического титратора, количественное определение фенольных кислот – методом прямой спектрофотометрии. **Результаты.** В соке из плодов *Empetrum nigrum* были идентифицированы яблочная, лимонная и винная кислоты, в соке из плодов *Vaccinium praestans*, помимо вышеперечисленных – обнаружена янтарная кислота. Сумма свободных органических кислот в пересчете на яблочную кислоту в соке красники составила $4,98 \pm 0,04\%$, в соке шикши – $1,01 \pm 0,01\%$. В плодах изучаемых растений также была определена галловая кислота. Количественное содержание фенольных кислот в спиртовых извлечениях плодов шикши черной и красники равнялось $3,59 \pm 0,09\%$ и $2,43 \pm 0,06\%$, соответственно. **Заключение.** Плоды *Vaccinium praestans* и *Empetrum nigrum* могут рассматриваться в качестве перспективного источника яблочной, лимонной, винной и галловой кислот.

Ключевые слова: красника, *Vaccinium praestans*, шикша, *Empetrum nigrum*, органические кислоты

Поступила в редакцию 26.03.2021. Получена после доработки 24.04.2021. Принята к печати 13.08.2021

Для цитирования: Саликова А.А., Пономарчук С.Г., Плаксен Н.В. Изучение химического состава плодов дальневосточных видов растений семейства вересковых (Ericaceae). *Тихоокеанский медицинский журнал*. 2021;3:40–4. doi: 10.34215/1609-1175-2021-3-40-44

Для корреспонденции: Саликова Анастасия Александровна – ассистент кафедры фармации Тихоокеанского государственного медицинского университета (690002, г. Владивосток, Океанский пр-т, 165); ORCID: 0000-0001-7732-4853; e-mail: a.salikova1992@bk.ru

Study of the chemical composition of fruits of far eastern plant species of the heather family (Ericaceae)

А.А. Salikova, S.G. Ponomarchuk, N.V. Plaksen

Pacific State Medical University, Vladivostok, Russia

Objective: The analysis of a chemical composition of fruits of far eastern species of plants of heather family (Ericaceae). **Methods:** Fresh fruit and juice of Kamchatka bilberry (*Vaccinium praestans*) and crowberry (*Empetrum nigrum*) were used. The composition of the organic acids in fruits and juice was studied using high performance liquid chromatography, quantifying free organic acids – alkalimetry method using automatic titrator, quantifying phenolic acids – direct spectrophotometry method. **Results:** Malic, citric and tartaric acids were identified in juice of *Empetrum nigrum* fruit. In addition to abovementioned acids, such acid as succinic was found in the juice of *Vaccinium praestans* fruit. The sum of free organic acids in terms of malic acid in Kamchatka bilberry juice was $4.98 \pm 0.04\%$, in crowberry juice – $1.01 \pm 0.01\%$. Gallic acid was also detected in the fruits of studied plants. The quantitative content of phenolic acids in alcohol extracts from Kamchatka bilberry and crowberry equaled $3.59 \pm 0.09\%$ and $2.43 \pm 0.06\%$, respectively. **Conclusions:** *Vaccinium praestans* and *Empetrum nigrum* fruits can be considered as a perspective source of malic, citric, tartaric and gallic acids.

Keywords: bilberry, *Vaccinium praestans*, crowberry, *Empetrum nigrum*, organic acids

Received 26 March 2021; Revised 24 April 2021; Accepted 13 August 2021

For citation: Salikova AA, Ponomarchuk SG, Plaksen NV. Study of the chemical composition of fruits of far eastern plant species of the heather family (Ericaceae). *Pacific Medical Journal*. 2021;3:40–4. doi: 10.34215/1609-1175-2021-3-40-44

Corresponding author: Anastasiya A. Salikova, MD, assistant of the Department of Pharmacy, Pacific State Medical University (165 Okeansky Ave., Vladivostok, 690002, Russian Federation); ORCID:0000-0001-7732-4853; e-mail: a.salikova1992@bk.ru

Дикорастущие на Дальнем Востоке растения-концентраты биологически активных веществ стали объектом научного и практического интереса в силу разнообразия оказываемых ими фармакологических эффектов [1]. К одним из ярких представителей флоры Дальнего Востока относится семейство Вересковые (Ericaceae), к которому принадлежат брусника

(*Vaccinium vitis-idaea*), голубика (*Vaccinium uliginosum*), черника (*Vaccinium myrtillus*), красника (*Vaccinium praestans*) и шикша черная (*Empetrum nigrum*) [2]. Особый интерес у современных исследователей вызывают нефармакопейные растения этого семейства – красника или вакциниум превосходный [3] и шикша черная [4].

Вакциниум превосходный – многолетний стелющийся листопадный кустарничек. Листья крупные, жесткие, округлой формы, меняют свою окраску в течение всего сезона. Ягоды красники собраны в кисти по 5–6 сочных плодов шаровидной формы и покрыты глянцевой кожурой ярко-красного цвета [5]. Шикша черная – двудомный, вечнозеленый сильноветвистый кустарничек. Листовая пластинка свернута в трубку, заполненную беловатыми волосками. Плод – сочная костянка черного цвета, иногда неправильной формы [6]. Плоды вакциниума превосходного и шикши черной считаются природными источниками уникального набора биологически активных соединений: органических кислот, витаминов, флавоноидов, антоцианов, дубильных веществ и др. [7]. Органические кислоты способны увеличивать уровень водородного показателя внутренней среды человека, постепенно они ощелачивают организм и способствуют перистальтике кишечника, стимулируют выделение желудочного сока, замедляют рост гнилостных бактерий, значительно снижают интенсивность брожения в толстом кишечнике [8]. Гидрофильные полифенолы, которыми богаты эти плоды, относятся к естественным антиоксидантам, легко включаются в метаболические процессы, защищая организм от пагубного действия активных форм кислорода [9].

Комплексные исследования антиоксидантного эффекта плодов красники [3] и радиозащитного действия плодов шикши черной [10], проведенные на кафедре фармации ТГМУ, стали отправной точкой для изучения количественного и качественного состава органических кислот различной химической структуры. Цель настоящей работы – анализ химического состава плодов дальневосточных видов растений семейства вересковых (Ericaceae).

Материал и методы

Использованы свежие плоды и сок из плодов красники и шикши черной. Сырье заготовлено в период технической зрелости в Камчатском крае. Сок получали методом прямого отжима на ручном прессе. Изучение качественного состава органических кислот в соках из плодов объектов исследования проводили методом высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ) согласно ГОСТу 32771-2014 [11]. Условия хроматографии (по 20 мкл растворов образцов): высокоэффективный жидкостный хроматограф LC-20 Prominence (Shimadzu, Япония); неподвижная фаза – металлическая колонка Shim-pack GIST C18 размером 4,6×250 мм, размер частиц 5 микрон, температура колонки 30 °С; подвижная фаза: 0,1М фосфатный буфер (рН 2,54); скорость подачи элюента 0,8 мл/мин., продолжительность анализа 30 мин., фиксация результатов с помощью ультрафиолетового детектора Shimadzu SPD-20AV при длине волны 210 нм. Для сравнения использовали растворы рабочих стандартных

образцов органических кислот, которые готовили по методике, регламентированной ГОСТ 32771-2014 [11].

Сумму свободных органических кислот в соках из плодов красники и шикши определяли методом алкалометрии с помощью автоматического титратора серии Т50 (Mettler-Toledo GmbH, Швейцария), который непрерывно измеряет сигнал и самостоятельно определяет конечную точку титрования. В колбу вместимостью 100 мл прибавляли 1 мл сока, доводили водой до метки и перемешивали. Отбирали 10 мл полученного разведения, помещали в колбу вместимостью 300 мл, прибавляли 200 мл свежепрокипяченной воды, 1 мл 1 % спиртового раствора фенолфталеина, 2 мл 0,1 % раствора метиленового синего и титровали 0,1М раствором гидроксида натрия до регистрации прибором точки эквивалентности [12]. Сумму (X) органических кислот в пересчете на яблочную кислоту в процентах вычисляли по формуле [12]:

$$X = \frac{V_T \times 0,0067 \times 100 \times 100 \%}{V_a \times 10 \times \rho},$$

где V_T – объем 0,1М раствора натрия гидроксида, пошедшего на титрование (мл), 0,0067 – количество яблочной кислоты, соответствующее 1 мл 0,1М раствора натрия гидроксида, V_a – объем сока (мл); ρ – плотность сока (г/дм³).

Для определения наличия фенольных кислот в сырье брали по одному грамму (точная навеска) измельченных свежих плодов, прошедших сквозь отверстия сита диаметром 2 мм, помещали в колбу вместимостью 100 мл, приливали 30 мл экстрагента (50 % этиловой спирт), присоединяли колбу к обратному холодильнику и кипятили на водяной бане в течение 30 мин. с момента закипания. Полученное извлечение фильтровали через бумажный фильтр в колбы вместимостью 100 мл, добавляли 30 мл экстрагента (50 % этиловой спирт) и повторяли экстракцию дважды по данной методике. После охлаждения объем суммарного извлечения доводили 50 % этиловым спиртом до метки, 25 мл полученного раствора помещали в колбу вместимостью 100 мл и доводили до метки 50 % этиловым спиртом (исследуемые растворы) [13]. Для сравнения использовали 0,05 % спиртовой раствор галловой кислоты.

По 20 мкл растворов для исследования и раствора галловой кислоты хроматографировали на высокоэффективном жидкостном хроматографе фирмы Shimadzu LC-20 Prominence (Япония), неподвижная фаза: металлическая колонка Shim-pack GIST C18 размером 4,6×250 мм, размер частиц 5 микрон; подвижная фаза: 85 % 0,01М фосфатного буфера (рН 3,05) и 15 % ацетонитрила; скорость подачи элюента 0,7 мл/мин., продолжительность анализа 30 мин., фиксация результатов с помощью ультрафиолетового детектора Shimadzu SPD-20AV при длине волны 254 нм.

Для количественного определения фенольных кислот плоды измельчали до размера частиц, проходящих

Рис. 1. Хроматограмма органических кислот сока из плодов *Vaccinium praestans*:

1 – винная кислота; 2 – яблочная кислота; 3 – лимонная кислота; 4 – янтарная кислота.

Рис. 2. Хроматограмма органических кислот сока из плодов *Empetrum nigrum*:

1 – винная кислота; 2 – яблочная кислота; 3 – лимонная кислота.

Рис. 3. Хроматограмма спиртовых извлечений из плодов *Vaccinium praestans* с пиком галловой кислоты (1).

Рис. 4. Хроматограмма спиртовых извлечений из плодов *Empetrum nigrum* с пиком галловой кислоты (1).

сквозь сито с отверстиями диаметром 2 мм. Точные навески сырья (по одному грамму) помещали в колбу вместимостью 100 мл, добавляли 50 мл экстрагента (50 % этиловый спирт), присоединяли к обратному холодильнику и кипятили на водяной бане в течение часа с момента закипания смеси. После охлаждения полученное извлечение фильтровали через бумажный фильтр в мерную колбу объемом 100 мл и доводили объем до метки тем же экстрагентом (раствор А). Этот раствор в объеме 5 мл помещали в мерную колбу вместимостью 100 мл и 50 % этиловым спиртом доводили объем до метки (раствор Б) [14]. Для приготовления раствора стандартного образца галловой кислоты 0,05 г (точная навеска этой кислоты) помещали в мерную колбу вместимостью 100 мл, прибавляли 50 мл 50 % этилового спирта, тщательно перемешивали до растворения, доводили объем до метки тем же растворителем, 2 мл полученного раствора помещали в колбу вместимостью 100 мл и доводили до метки тем же растворителем [14]. Оптическую плотность полученных извлечений и раствора галловой кислоты измеряли на спектрофотометре UNICO 2800 UV/VIS (США) при длине волны 276 нм. Раствором сравнения был 50 % этиловый спирт. Содержание фенольных кислот (X) в пересчете на галловую кислоту вычисляли по формуле [14]:

$$X = \frac{D \times m_0 \times 2 \times 100 \times 100}{D_0 \times m \times 5 \times (100 - W)},$$

где D – оптическая плотность исследуемого раствора, D_0 – оптическая плотность раствора галловой кислоты, m – масса навески сырья в граммах, m_0 – масса навески

Таблица 1

Результаты определения количественного содержания органических кислот в соках из плодов методом ВЭЖХ

Кислота	<i>Vaccinium praestans</i>		<i>Empetrum nigrum</i>	
	Время удерживания, мин.	Содержание в смеси, %	Время удерживания, мин.	Содержание в смеси, %
Винная	3,766	2,43	4,031	16,70
Яблочная	5,088	38,87	5,086	13,35
Лимонная	7,712	46,53	7,766	11,27
Янтарная	10,533	0,06	–	–

галловой кислоты в граммах, W – потеря в массе при высушивании сырья в процентах.

Результаты исследования подвергали статистической обработке согласно требованиям ОФС.1.1.0013.15 «Статистическая обработка результатов химического эксперимента» Государственной фармакопеи РФ с использованием критерия Стьюдента (t) и с расчетом средних арифметических и доверительного интервала ($\bar{x} \pm \Delta x$), стандартного отклонения (s) и относительной ошибки методов количественного определения (ϵ) [15].

Результаты исследования

В соке из плодов изучаемых объектов методом ВЭЖХ были идентифицированы винная, яблочная, лимонная и янтарная кислоты (рис. 1, 2). Результаты качественного определения органических кислот в соках представлены в табл. 1.

Таблица 2

Результаты определения суммы свободных органических кислот в соке из плодов методом алкалиметрии

Сок из плодов	n	f	$\bar{x}$, %	s	s ²	P, %	t (P, f)	Δx	ϵ , %
<i>Vaccinium praestans</i>	5	4	4,98	0,036	0,0013	95	2,78	0,04	0,90
<i>Empetrum nigrum</i>	5	4	1,01	0,008	0,00006	95	2,78	0,01	0,97

Таблица 3

Результаты количественного определения фенольных кислот в свежих плодах методом алкалиметрии

Плоды	n	f	$\bar{x}$, %	s	s ²	P, %	t (P, f)	Δx	ϵ , %
<i>Vaccinium praestans</i>	5	4	2,43	0,05	0,0027	95	2,78	0,060	2,67
<i>Empetrum nigrum</i>	5	4	3,59	0,07	0,0051	95	2,78	0,088	2,46

Методом алкалиметрии была определена сумма свободных органических кислот в пересчете на яблочную кислоту. Относительная ошибка метода с использованием автоматического титратора не превышала 1 % (табл. 2). Методом ВЭЖХ в плодах семейства Вересковые была обнаружена галловая кислота (рис. 3, 4).

Результаты количественного определения фенольных кислот в изучаемых плодах указаны в табл. 3.

Обсуждение полученных данных

Исследование состава органических кислот сока из плодов *Vaccinium praestans* и *Empetrum nigrum*, собранных в Камчатском крае, свидетельствует о присутствии яблочной, лимонной и винной кислот. Помимо вышеперечисленных, в соке из плодов красники была определена янтарная кислота. Также установлено наличие галловой кислоты в плодах шикши черной и красники. Идентифицированные органические и фенольные кислоты обладают разнообразными фармакологическими свойствами, что может быть основой суммарного фармакологического действия растений [7]. Так, например, лимонная и яблочная кислоты ускоряют метаболизм, винная и лимонная кислоты замедляют процессы гниения, янтарная кислота оказывает мощный антирадикальный эффект, галловая кислота имеет противомикробное, антиоксидантное и иммуномодулирующее свойства [8].

Визуальная регистрация точки эквивалентности при количественном определении свободных органических кислот титриметрическим методом имеет ряд весомых недостатков: высокая погрешность метода (3–7 %), затруднения в регистрации и др. Использование автоматического титратора, самостоятельно регистрирующего точку эквивалентности для определения суммы органических кислот, позволяет провести более точный анализ (относительная ошибка метода – менее 1 %), что было показано в настоящем эксперименте. Так, сок шикши черной значительно уступает соку красники в количественном содержании свободных органических кислот: $1,01 \pm 0,01$ и $4,98 \pm 0,04$ %, соответственно.

Содержание фенольных соединений в плодах шикши – $3,59 \pm 0,09$ %, а в плодах красники – $2,43 \pm 0,06$ %.

Таким образом, плоды *Vaccinium praestans* и *Empetrum nigrum* могут рассматриваться в качестве перспективного источника яблочной, лимонной, винной и галловой кислот.

Конфликт интересов: авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей статьи.

Источник финансирования: авторы заявляют о финансировании проведенного исследования из собственных средств.

Литература / References

1. Фролова Н.А., Резниченко И.Ю. Исследование химического состава плодово-ягодного сырья Дальневосточного региона как перспективного источника пищевых и биологически активных веществ. *Вопросы питания*. 2019;88(2):83–90. [Frolova NA, Reznichenko IYu. Investigation of the chemical composition of fruit and berry raw materials of the Far Eastern Region as a perspective source of nutrients and bioactive compounds. *Problems of Nutrition*. 2019;88(2):83–90 (In Russ).]
2. Нечаев А.А. Видовой состав, ресурсы и освоение дикорастущих ягодных растений российского Дальнего Востока. *Лесной вестник*. 2012;3:30–4. [Nechaev AA. Species composition, resources and development of wild berry plants of the Russian Far East. *Forestry Bulletin*. 2012;3:30–4 (In Russ).]
3. Плаксен Н.В., Степанов С.В., Устинова Л.В. Гепатопротекторное действие сиропа из плодов вакциниума превосходного. *Тихоокеанский медицинский журнал*. 2014;2:59–62. [Plaksen NV, Stepanov SV, Ustinova LV. Hepatoprotective effect of *Vaccinium praestans* syrup. *Pacific Medical Journal*. 2014;2:59–62 (In Russ).]
4. Плаксен Н.В., Устинова Л.В., Степанов С.В., Пономарчук С.Г., Парфенова Е.А. Коррекция экспериментального остеопороза соком и шротом плодов шикши черной. *Тихоокеанский медицинский журнал*. 2019;1:37–41. [Plaksen NV, Ustinova LV, Stepanov SV, Ponomarchuk SG, Parfenova EA. Correction of experimental osteoporosis with juice and oil meal of *Empetrum nigrum* fruits. *Pacific Medical Journal*. 2019;1:37–41 (In Russ).]
5. Черныгина О.А. Красника *Vaccinium praestans* на Камчатке. *Материалы XIII международной научной конференции «Сохранение биоразнообразия Камчатки и прилегающих морей»*. Петропавловск-Камчатский: Камчатпресс; 2012:124–8. [Chernyagina OA. *Vaccinium praestans* in Kamchatka. *Materials of XIII international scientific conference «Conservation of*

- biodiversity of Kamchatka and coastal waters*. Petropavlovsk-Kamchatsky: Kamchatpress; 2012:124–8 (In Russ).]
6. Андреева Н.В., Малогулова И.Ш. Виды шикши как перспективный источник БАВ в условиях Якутии. *Современные наукоемкие технологии*. 2013;9:51–2. [Andreeva NV, Malogulova ISh. Shiksha species as a prospective source of bas in the conditions of Yakutia. *Modern High Technologies*. 2013;9:51–2 (In Russ).]
 7. Крышняя С.В., Красикова В.И. Химический состав плодов и листьев *Vaccinium praestans*. *Наземные экосистемы острова Сахалина: сб. трудов*. Южно-Сахалинск; 1999:121–8. [Kryshnyaya SV, Krasikova VI. Chemical composition of fruits and leaves of *Vaccinium praestans*. *Terrestrial Ecosystems of Sakhalin Island*. Yuzhno-Sarhalinsk; 1999:121–8 (In Russ).]
 8. Стариченко А.В., Сердюченко И.В. Органические кислоты в нашей жизни. *Новая наука: современное состояние и пути развития*. 2017;1–2:7–10. [Starichenko AV, Serdyuchenko IV. Organic acids in our lives. *New Science: Current State and Ways of Development*. 2017;1–2:7–10 (In Russ).]
 9. Коренская И.М., Милыева Е.А. Антиоксидантная активность плодов растений семейств Ericaceae и Caprifoliaceae. Пути и формы совершенствования фармацевтического образования. *Создание новых физиологически активных веществ: мат. 6-й Международной научно-методической конференции «Фармобразование-2016»*. Воронеж, 2016:320–2. [Korenskaya IM, Milyaeva EA. Antioxidant activity of fruits of plants of the Ericaceae and Caprifoliaceae families. *Ways and Forms of Improving Pharmaceutical Education. Creation of New Physiologically Active Substances*. Voronezh; 2016:320–2 (In Russ).]
 10. Плаксен Н.В., Устинова Л.В., Степанов С.В., Степачева О.М., Пономарчук С.Г. Влияние природных средств на компенсаторные возможности организма при воздействии внешнего облучения в эксперименте. *Университетская наука – практическому здравоохранению*. Владивосток: Медицина ДВ, 2020. [Plaksen NV, Ustinova LV, Stepanov SV, Stepacheva OM, Ponomarchuk SG. The influence of natural remedies on the compensatory possibilities of the organism under the exposure of external irradiation in experiment. *University Science – Practical Health Care*. Vladivostok: Medicina DV; 2020 (In Russ).]
 11. ГОСТ 32771-2014. *Продукция соковая. Определение органических кислот методом обращенно-фазовой высокоэффективной жидкостной хроматографии*. 2014. [GOST 32771-2014. *Produktsiya sokovaya. Opredelenie organicheskikh kislot metodom obrashchenno-fazovoi vysokoehffektivnoi zhidkostnoi khromatografii*. 2014 (In Russ).]
 12. Степанов С.В., Саввина А.Л. Получение и стандартизация сиропа плодов калины Саржента. *Тихоокеанский медицинский журнал*. 2010;2:102–4. [Stepanov SV, Savvina AL. Derivation and standardization of Sargenta arrow-wood fruit syrup. *Pacific Medical Journal*. 2010;2:102–4 (In Russ).]
 13. Червонная Н.М., Андреева О.А. Об антиоксидантной активности спирто-водных извлечений из цветков бархатцев распростертых. *Современные проблемы науки и образования*. 2015;2–3:239. [Chervonnaya NM, Andreeva OA. About antioxidant activity of the alcohol-water extracts from the flowers *Tagetes patula*. *Modern Problems of Science and Education*. 2015;2–3:239 (In Russ).]
 14. Гаврилин М.В., Попова О.И., Губанова Е.А. Фенольные соединения надземной части шалфея мускатного (*Salvia sclarea* L.), культивируемого в Ставропольском крае. *Химия растительного сырья*. 2010;4:99–104. [Gavrilin MV, Popova OI, Gubanova EA. Phenolic compounds of the aerial part of clary sage (*Salvia sclarea* L.) cultivated in the Stavropol Territory. *Chemistry of Plant Raw Materials*. 2010;4:99–104 (In Russ).]
 15. *Государственная фармакопея Российской Федерации*, XIV издание. [Gosudarstvennaya farmakopeya Rossiyskoy Federatsii, XIV izdaniye (In Russ).] URL: <http://femb.ru/femb/pharmacopea.php> (Accessed 3 March 2021).